Experiências em Recuperação Ambiental

Código Florestal

- Restauração de mata ciliar por meio de semeadura direta mecanizada

Restauração de mata ciliar por meio de semeadura direta mecanizada

- 1. Bioma:** Amazônia   **Estado:** Mato Grosso   **Município:** Querência-MT
- 2. Fitofisionomia (IBGE, 2012):** Floresta Estacional Sempre-Verde (Floresta Estacional Perenifólia)
- 3. Categoria da área onde o modelo foi testado:** Área de Preservação Permanente
- 4. Objetivo de implantação do modelo:** Restauração ecológica por meio de semeadura direta mecanizada, utilizando-se de plantadeira de soja para plantio direto. Trata-se de uma técnica alternativa de plantio que vem sendo testada na região das cabeceiras do rio Xingu, pela qual a Embrapa tem grande interesse em seu desenvolvimento, em particular pelo grande potencial de uso na recuperação de áreas extensas.
- 6. Aplicabilidade:** pode ser utilizada independentemente do número de módulos fiscais da propriedade em áreas de preservação permanente, e mesmo em áreas de reserva legal, atentando-se para o conjunto de espécies selecionadas para cada caso.
- 7. Histórico da área:** área de preservação permanente degradada, anteriormente ocupada com plantio de soja, alternado com pastagem.
- 8. Condições gerais da área com relação a solo e relevo:** Área de Preservação Permanente, incluindo uma nascente e faixas marginais de curso d'água; Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico; terreno levemente inclinado.
- 9. Descrição passo a passo para a implantação:**

A área objeto da restauração foi de 2 ha. A semeadura mecanizada foi complementada pela semeadura a lanço e pelo plantio de sementes em covas, conforme as características das sementes (tamanho e peso). As principais etapas da restauração são descritas abaixo:

  - Isolamento da área com cerca para evitar o pisoteio de animais e danos à regeneração natural;
  - Roçagem baixa da *Urochloa* (Braquiária);
  - Separação das sementes utilizadas (Tabela 1) em quatro grupos, de acordo com o seu tamanho e peso, como abaixo:
    - a. sementes de tamanho e peso médio (por exemplo, angico, angelim, tamboril, baru e caju), para acondicionamento na caixa de adubo da plantadeira;

- b. sementes meio leves (por exemplo, feijão-guandu e mamoinha), para acondicionamento na caixa de sementes da plantadeira;
- c. sementes muito leves (por exemplo, tingui, peroba e os ipês), para semeadura a lanço e leve recobrimento de solo após o plantio mecanizado;
- d. sementes maiores, que não passam na rosca-sem-fim da plantadeira (por exemplo, pequi, jatobá e tucum) para plantio em covas após o plantio mecanizado.

Na mistura “a”, (sementes colocadas na caixa de adubo) foram misturados 190 kg de sementes nativas com 200 kg de adubo na formulação **0-18-18**, com **Ca** 11%, **S** 5,4 %, **B** 0,54%, **Mn** 0,06% e **Zn** 0,27% e 240 kg de terra fica e seca.

- O plantio foi feito utilizando uma plantadeira de soja para plantio direto com 14 linhas.
- As aberturas das caixas de adubo e de sementes da plantadeira foram reguladas para distribuição das sementes, conforme abaixo:

Variedade de Semente	Sementes por metro linear
Feijão-guandu	3 a 5
Espécies arbustivas e arbóreas	15 a 30

- Plantio de feijão-guandu e feijão-de-porco juntamente com as espécies arbustivas e arbóreas visando proporcionar rápido recobrimento do solo e microclima favorável para o desenvolvimento de espécies de crescimento mais lento, além de contribuir na fixação de nitrogênio e incorporação de matéria orgânica ao solo.

Figura 1. Mistura de sementes (à esquerda); adubo misturado às sementes (à direita).

Figura 2. Adição de terra à mistura de sementes (à esquerda); Mistura de sementes com terra e adubo na caixa de adubo da plantadeira (à direita).

Figura 3. Operação de plantio mecanizado.

Figura 4. Área do plantio, 30 dias após a operação.

Figura 5. Visão geral do interior da área restaurada após 6 anos do plantio.

Tabela 1. Nomes populares e científicos das espécies utilizadas.

	Nome popular	Nome científico
1	Açaizinho	<i>Euterpe catinga</i>
2	Acerola	<i>Malpighia glabra</i>
3	Amoreira	<i>Morus nigra</i>
4	Angelim-do-cerrado	<i>Andira anthelmia</i>
5	Aroeira-verdadeira	<i>Myracrodruon urundeuva</i>
6	Barbatimão	<i>Stryphnodendron adstringens</i>
7	Baru	<i>Dipteryx alata</i>
8	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>
9	Café-bravo	<i>Vismia guianensis</i>
10	Cajazinho	<i>Spondias mombin</i>
11	Cajuí, cajuzinho-do-cerrado	<i>Anacardium humile</i>
12	Calabura	<i>Muntingia calabura</i>
13	Capitão-do-campo	<i>Terminalia argentea</i>
14	Caroba	<i>Jacaranda copaia</i>
15	Carvoeiro	<i>Sclerolobium paniculatum</i>
16	Chichá	<i>Sterculia</i> sp.
17	Copaiba	<i>Copaifera langsdorffii</i>
18	Curiola	<i>Pouteria ramiflora</i>
19	Embauba	<i>Cecropia</i> sp.
20	Figueira	<i>Ficus</i> sp.
21	Garapa	<i>Apuleia leiocarpa</i>
22	Genipapo	<i>Genipa americana</i>
23	Guaritá, aroeira-falsa	<i>Astronium lecointei</i>
24	Guatambu	<i>Aspidosperma macrocarpon</i>
25	Ipê amarelo-do-cerrado	<i>Handroanthus ochraceus</i>
26	Ipê-amarelo-da-mata	<i>Handroanthus serratifolius</i>
27	Ipê-caraiba	<i>Tabebuia aurea</i>
28	Ipê-roxo	<i>Handroanthus impetiginosus</i>
29	Jacarandá bico de papagaio	<i>Machaerium acutifolium</i>
30	Jambo-da-mata	<i>Bellucia grossularioides</i>
31	Jatobá-da-mata	<i>Hymenaea courbaril</i>
32	Jatobá-de-brinco	<i>Peltogyne</i> sp.
33	Lixeira	<i>Curatella americana</i>
34	Mamica-de-porca	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>
35	Mamoninha	<i>Mabea fistulifera</i>
36	Mandiocão	<i>Schefflera morototoni</i>

	Nome popular	Nome científico
37	Mirindiba	<i>Trema micrantha</i>
38	Mirindiba, tarumarana	<i>Buchenavia</i> sp.
39	Mirindiba-miúda	<i>Buchenavia tetrphylla</i>
40	Mogno	<i>Swietenia macrophylla</i>
41	Morcegueira-lisa	<i>Andira</i> sp.
42	Murici-da-mata	<i>Byrsonima</i> sp.
43	Mutamba	<i>Guazuma ulmifolia</i>
44	Oiti	<i>Couepia grandiflora</i>
45	Oiti-da-mata	<i>Licania</i> sp.
46	Orelha-de-nego, tamboril	<i>Enterolobium</i> sp.
47	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia</i> sp.
48	Pau-terra	<i>Qualea</i> sp.
49	Pente-de-macaco	<i>Apeiba tibourbou</i>
50	Pequi	<i>Caryocar brasiliense</i>
51	Peroba	<i>Aspidosperma</i> sp.
52	Pimenta-de-macaco	<i>Xylopia aromatica</i>
53	Pinhão manso	<i>Jatropha curcas</i>
54	Pitanga-da-mata	<i>Calypttranthes paniculata</i>
55	Quina	<i>Strychnos pseudoquina</i>
56	Sucupira-branca	<i>Pterodon pubescens</i>
57	Tingui	<i>Magonia pubescens</i>
58	Tucum	<i>Astrocaryum</i> sp.
59	Urucum	<i>Bixa orellana</i>
60	Vinhático, amarelinho	<i>Plathymenia reticulata</i>
61	Virola	<i>Virola</i> sp.

10. Custo total de implantação/ha (R\$): R\$ 3.250,00

11. Detalhamento dos custos:

Tabela 2. Custos da restauração por semeadura mecanizada em R\$ / Hectare.

Ítem de Despesa	Custo Unitário	Horas-máquina / ha	Kg / ha	R\$ total
feijão-guandú	R\$ 9,00 / Kg		10	R\$ 90,00
feijão-de-porco	R\$ 12,00 / Kg		80	R\$ 960,00
Sementes nativas	R\$ 25,00 / Kg		64	R\$ 1.600,00
preparo da área*	R\$300,00/ hora	2		R\$ 600,00
plântio**	R\$ 300,00	0,5		R\$ 150,00
Valor Total				R\$ 3.250,00***

* incluído a roçada e amontoa do capim;

** total 1 passada com plantadeira de plântio direto de soja.

*** valor pode ser alterado dependendo da disponibilidade e preço das sementes, transporte de insumos e mão-de-obra local.

12. Avaliação:

A semeadura direta mecanizada pode ser utilizada com vantagens sobre as **técnicas tradicionais de plantio, como a que se utiliza** da abertura de covas (manual ou com trado mecanizado) e plântio de mudas. Um dos pontos positivos, é a rapidez com que a operação de plântio ocorre no campo uma vez cumpridas as etapas preliminares de separação das sementes em grupos de acordo com o seu tamanho e peso, trato das sementes para quebra de dormência, e mistura de adubo e terra para a produção das misturas finais a serem colocadas nas caixas de sementes e de adubo da plantadeira. Mesmo para as sementes maiores ou muito leves as quais não podem ser semeadas com o uso de plantadeira, o processo de semeadura a lanço ou de plântio em pequenas covas pode ser relativamente rápido, dependendo da disponibilidade de mão-de-obra na operação.

O sucesso final do plântio e da restauração, contudo, é dependente de alguns fatores, os quais são apontados abaixo:

- **Dormência de sementes:** algumas espécies produzem sementes com algum tipo de dormência, as quais devem ser quebradas antes do plântio. A exemplo disso podem ser citadas as espécies *Trema micranta* (água quente 50°C/5min); *Copaifera languiadorffii* (escarificação mecânica); *Stryphnodendron adstringens* (tratamento ácido/5 min); *Hymenaea courbaril* (escarificação mecânica com lixa); *Guazuma ulmifolia* (água 90°C/1 min) (Vieira & Fernandes, 2015).
- Controle de plantas competidoras: no caso específico, o maior problema foi com relação à presença e controle de *Urochloa* (Braquiária). O insucesso no controle da gramínea pode comprometer o desenvolvimento das plantas. O sombreamento proporcionado pelas leguminosas de cobertura e de crescimento rápido (ex: feijão-grandu e feijão-de-porco) atenuou o problema, mas não o resolveu totalmente.
- Ajustes das aberturas da plantadeira para a liberação de sementes nas caixas de sementes e de adubo: esta operação de ajuste deve ocorrer previamente ao plântio, já com as misturas acondicionadas nas caixas de sementes e

adubo, em área limpa onde a avaliação possa ocorrer (contagem do número de sementes liberadas por cada caixa, por metro linear).

- Profundidade de plantio: atenção especial quanto à profundidade em que as sementes são enterradas no plantio, não devendo ultrapassar 2-3 cm de profundidade.
- Preço das sementes: este é um fator que pode inviabilizar o uso da técnica apresentada acima em regiões onde há pouca disponibilidade de sementes e os preços são elevados. Isso porque a técnica requer um número extra de sementes, se comparado a outras técnicas não mecanizadas.
- Monitoramento: etapa importante, já a partir de 10 dias do plantio, verificando a ocorrência de germinações e iniciando o controle de plantas competidoras, caso necessário (ex: coroamento e amontoa de palhada no colo das plantas).

13. Referências bibliográficas:

Vieira, I.G.; Fernandes, G.D. Métodos de Quebra de Dormência de Sementes. Disponível em

<http://www.ipef.br/tecsementes/dormencia.asp>. Acesso em 18/12/2015.

14. **Parcerias:** a experiência de campo descrita acima foi realizada no âmbito do projeto “Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Promoção de Boas Práticas Agropecuárias na Bacia do Rio Xingu” coordenado pela Embrapa Meio Ambiente e apoiado pelo CT-Agro e CNPq, em parceria do Instituto Socioambiental (ISA) dentro da campanha *Y Ikatu Xingu*.

15. Responsável pelo fornecimento das informações/UD ou Instituição:

Ladislau Skorupa (Embrapa Meio Ambiente)

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO