



BIOMA CERRADO

Época de
coleta de
frutos e
sementes
nativos para
recomposição
ambiental



Embrapa

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), previsto na Lei 12.651/2012, a qual dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida como novo Código Florestal, demonstrou a necessidade de recomposição de passivos ambientais nos imóveis rurais, relacionados às Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal (ARL) e de Uso Restrito (AUR), declarados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR).

Um dos principais gargalos para promover a recomposição ambiental dessas áreas é a disponibilidade de sementes e mudas de espécies nativas mais indicadas, em especial aquelas com potencial para aproveitamento econômico. Nesse sentido, esse calendário traz o período mensal de coleta de frutos e sementes de 330 espécies arbóreas e arbustivo-herbáceas nativas para a recomposição de APP e ARL com formações florestais, savânicas e campestres do bioma Cerrado.

Este calendário pode ser útil para orientar agricultores, técnicos e viveiristas, bem como gestores de políticas públicas voltadas à produção rural sustentável. A época de coleta de cada espécie aqui sugerida foi obtida em literatura especializada sobre plantas nativas que ocorrem no bioma e validadas com base em dados cadastrados em herbários e centros de pesquisa, e com o apoio de viveiristas regionais, especialistas e pesquisadores da Embrapa e universidades.

Esse trabalho foi baseado no levantamento realizado pela **Embrapa**, no âmbito do Projeto Especial “Soluções Tecnológicas para a Adequação da Paisagem Rural ao Código Florestal Brasileiro” (saiba mais em: www.webambiente.gov.br), coordenado pelo **Departamento de Transferência de Tecnologia**, em parceria com o **Ministério do Meio Ambiente**, por meio da **Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável e do Serviço Florestal Brasileiro**.

JULIANA SIMÕES

Secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDR
Ministério do Meio Ambiente – MMA

CLAUDIO TAKAO KARIA

Chefe-Geral da Embrapa Cerrados

Como usar esse calendário

Elaborado na forma de um calendário/planejador, esse material disponibiliza a época de maturação dos frutos e coleta de sementes para 330 espécies nativas do bioma Cerrado, sendo 250 arbóreas e 80 arbustivo-herbáceas. O pico de frutificação para essas espécies ocorre de setembro a janeiro (Fig. 1).

Para cada mês são apresentados exemplos ilustrados de espécies com frutos e sementes maduros naquele mês em questão. Na página adjacente há um planejador onde você poderá fazer anotações, bem como marcar o dia da semana e o ano à mão, como um “calendário infinito”. Ao final, estão disponibilizadas as listas de espécies sugeridas para recomposição ambiental no Cerrado com frutos e sementes maduros para cada mês, divididas em arbóreas e arbustivo-herbáceas.

É importante ressaltar, no entanto, que diferentes espécies podem apresentar variação quanto ao ciclo de frutificação e produção de sementes ao longo dos anos ou mesmo dependendo da região de ocorrência. Desse modo, essa publicação deve ser usada como um guia que sinaliza a época do ano “mais provável” para obtenção e coleta de sementes dessas espécies nativas do Cerrado.





Figura 1. Número de espécies sugeridas para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros por mês. Total de 330 espécies.

Colaboradores:	
Alexandre Bonesso Sampaio	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Déborah da Silva Santos	Universidade de Brasília (UnB)
Geovane Alves de Andrade	Embrapa Cerrados
José Felipe Ribeiro	Embrapa Cerrados
Maria Cristina de Oliveira	Universidade de Brasília (UnB)
Marcelo Kuhlmann Peres	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Manoel Cláudio da Silva Júnior	Universidade de Brasília (UnB)
Ravana Marques Souza	Universidade de Brasília (UnB)
Roberto Shojirou Ogata	Viveiro Cerrado Vivo

Fotos:	
Marcelo Kuhlmann	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projeto Gráfico:	
Fabiano Bastos	Embrapa Cerrados
Marcelo Kuhlmann	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Exemplos de espécies com frutos maduros em **JANEIRO**


1. *Alibertia edulis* (marmelada-de-cavalo)
2. *Annona crassiflora* (araticum)
3. *Blepharocalyx salicifolius* (maria-preta)
4. *Byrsonima intermedia* (murici-pequeno)
5. *Caryocar brasiliense* (pequizeiro)
6. *Connarus suberosus* (araruta-do-campo)
7. *Diospyros hispida* (caquizeiro-do-cerrado)
8. *Matayba guianensis* (camboatá-branco)
9. *Pouteria torta* (currióla)
10. *Salacia crassifolia* (bacupari-do-cerrado)

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S
30	D	S	T	Q	Q	S	S
31	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

JANEIRO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **FEVEREIRO**

1. *Byrsonima verbascifolia* (murici-de-tabuleiro)
2. *Cheiloclinium cognatum* (bacupari-da-mata)
3. *Echinolaena inflexa* (capim-flexinha)
4. *Euterpe edulis* (açai-do-cerrado)
5. *Myrcia splendens* (araçazinho)

6. *Parinari obtusifolia* (fruta-de-ema)
7. *Rhamnidium elaeocarpum* (cafezinho)
8. *Siparuna guianensis* (limão-bravo)
9. *Tapirira guianensis* (fruta-de-pombo)
10. *Trema micrantha* (grandiúva)

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

FEVEREIRO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **MARÇO**

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Annona coriacea</i> (marolo) | 6. <i>Guettarda viburnoides</i> (veludo-branco) |
| 2. <i>Cardiopetalum calophyllum</i> (embira) | 7. <i>Tapirira obtusa</i> (fruta-de-pombo) |
| 3. <i>Celtis iguanaea</i> (juá-mirim) | 8. <i>Tocoyena formosa</i> (jenipapo-de-cavalo) |
| 4. <i>Genipa americana</i> (jenipapeiro) | 9. <i>Trembleya parviflora</i> (trembleia) |
| 5. <i>Gomphrena arborescens</i> (para-tudo) | 10. <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> (maminha-de-porca) |

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S
30	D	S	T	Q	Q	S	S
31	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

MARÇO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **ABRIL**

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio) | 6. <i>Paspalum stellatum</i> (capim-estrela) |
| 2. <i>Bromelia balansae</i> (gravatá) | 7. <i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira) |
| 3. <i>Helicteres sacarolha</i> (sacarolha) | 8. <i>Pleroma granulosa</i> (quaresmeira) |
| 4. <i>Jacaranda ulei</i> (carobinha-do-campo) | 9. <i>Xylopia aromatica</i> (pimenta-de-macaco) |
| 5. <i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho); | 10. <i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva) |

1 D S T Q Q S S

2 D S T Q Q S S

3 D S T Q Q S S

4 D S T Q Q S S

5 D S T Q Q S S

6 D S T Q Q S S

7 D S T Q Q S S

8 D S T Q Q S S

9 D S T Q Q S S

10 D S T Q Q S S

11 D S T Q Q S S

12 D S T Q Q S S

13 D S T Q Q S S

14 D S T Q Q S S

15 D S T Q Q S S

16 D S T Q Q S S

17 D S T Q Q S S

18 D S T Q Q S S

19 D S T Q Q S S

20 D S T Q Q S S

21 D S T Q Q S S

22 D S T Q Q S S

23 D S T Q Q S S

24 D S T Q Q S S

25 D S T Q Q S S

26 D S T Q Q S S

27 D S T Q Q S S

28 D S T Q Q S S

29 D S T Q Q S S

30 D S T Q Q S S

ANO:

ABRIL



Exemplos de espécies com frutos maduros em **MAIO**

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Andropogon leucostachyus</i> (capim-membeca) | 6. <i>Leptolobium dasycarpum</i> (amargoso) |
| 2. <i>Cecropia pachystachya</i> (imbaúba-cinzenta) | 7. <i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco) |
| 3. <i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha) | 8. <i>Schinus terebinthifolius</i> (aroeira-pimenteira) |
| 4. <i>Enterolobium gummiferum</i> (orelha-de-macaco) | 9. <i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé) |
| 5. <i>Lepidaploa aurea</i> (chapadinha) | 10. <i>Zeyheria montana</i> (bolsa-de-pastor) |

1 D S T Q Q S S

2 D S T Q Q S S

3 D S T Q Q S S

4 D S T Q Q S S

5 D S T Q Q S S

6 D S T Q Q S S

7 D S T Q Q S S

8 D S T Q Q S S

9 D S T Q Q S S

10 D S T Q Q S S

11 D S T Q Q S S

12 D S T Q Q S S

13 D S T Q Q S S

14 D S T Q Q S S

15 D S T Q Q S S

16 D S T Q Q S S

17 D S T Q Q S S

18 D S T Q Q S S

19 D S T Q Q S S

20 D S T Q Q S S

21 D S T Q Q S S

22 D S T Q Q S S

23 D S T Q Q S S

24 D S T Q Q S S

25 D S T Q Q S S

26 D S T Q Q S S

27 D S T Q Q S S

28 D S T Q Q S S


29 D S T Q Q S S

30 D S T Q Q S S

31 D S T Q Q S S

ANO:

MAIO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **JUNHO**

1. *Bixa orellana* (urucum)
2. *Byrsonima basiloba* (murici-de-ema)
3. *Callisthene major* (itapiúna)
4. *Casearia sylvestris* (caferane)
5. *Heteropterys pteropetala* (murici-macho)

6. *Himatanthus obovatus* (vaca-leiteira)
7. *Pterodon emarginatus* (sucupira-branca-da-flor-roxa)
8. *Roupala montana* (carne-de-vaca)
9. *Vellozia squamata* (canela-de-ema)
10. *Xylopia emarginata* (pindaíba-preta)

1 D S T Q Q S S

2 D S T Q Q S S

3 D S T Q Q S S

4 D S T Q Q S S

5 D S T Q Q S S

6 D S T Q Q S S

7 D S T Q Q S S

8 D S T Q Q S S

9 D S T Q Q S S

10 D S T Q Q S S

11 D S T Q Q S S

12 D S T Q Q S S

13 D S T Q Q S S

14 D S T Q Q S S

15 D S T Q Q S S

16 D S T Q Q S S

17 D S T Q Q S S

18 D S T Q Q S S

19 D S T Q Q S S

20 D S T Q Q S S

21 D S T Q Q S S

22 D S T Q Q S S

23 D S T Q Q S S

24 D S T Q Q S S

25 D S T Q Q S S

26 D S T Q Q S S

27 D S T Q Q S S

28 D S T Q Q S S

29 D S T Q Q S S

30 D S T Q Q S S

ANO:

JUNHO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **JULHO**

1. *Calophyllum brasiliense* (landim)
2. *Davilla elliptica* (lixairinha)
3. *Dimorphandra mollis* (faveira-do-cerrado)
4. *Eremanthus erythropappus* (candeia)
5. *Hymenaea courbaril* (jatobá-da-mata)

6. *Kielmeyera speciosa* (pau-santo)
7. *Mauritia flexuosa* (buriti)
8. *Piptocarpha rotundifolia* (cambará-do-campo)
9. *Sterculia striata* (chichá-do-cerrado)
10. *Syagrus flexuosa* (coquinho-babão)

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S
30	D	S	T	Q	Q	S	S
31	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

JULHO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **AGOSTO**

1. *Aspidosperma macrocarpon* (peroba-mico)
2. *Buchenavia tomentosa* (pau-pilão)
3. *Calliandra dysantha* (caliandra)
4. *Cochlospermum regium* (algodão-bravo)
5. *Dipteryx alata* (baru)

6. *Eriotheca pubescens* (paineira-do-cerrado)
7. *Hymenaea stigonocarpa* (jatobá-do-cerrado)
8. *Magnolia ovata* (magnólia-do-brejo)
9. *Qualea grandiflora* (pau-terra)
10. *Strychnos pseudoquina* (quina-do-cerrado)

1 D S T Q Q S S

2 D S T Q Q S S

3 D S T Q Q S S

4 D S T Q Q S S

5 D S T Q Q S S

6 D S T Q Q S S

7 D S T Q Q S S

8 D S T Q Q S S

9 D S T Q Q S S

10 D S T Q Q S S

11 D S T Q Q S S

12 D S T Q Q S S

13 D S T Q Q S S

14 D S T Q Q S S

15 D S T Q Q S S

16 D S T Q Q S S

17 D S T Q Q S S

18 D S T Q Q S S

19 D S T Q Q S S

20 D S T Q Q S S

21 D S T Q Q S S

22 D S T Q Q S S

23 D S T Q Q S S

24 D S T Q Q S S

25 D S T Q Q S S

26 D S T Q Q S S

27 D S T Q Q S S

28 D S T Q Q S S


29 D S T Q Q S S

30 D S T Q Q S S

31 D S T Q Q S S

ANO:

AGOSTO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **SETEMBRO**

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Alchornea glandulosa</i> (tapiá) | 6. <i>Eugenia florida</i> (guamirim) |
| 2. <i>Brosimum gaudichaudii</i> (mama-cadela) | 7. <i>Garcinia brasiliensis</i> (bacuri) |
| 3. <i>Clusia criuva</i> (gameleira) | 8. <i>Guazuma ulmifolia</i> (mutamba) |
| 4. <i>Curatella americana</i> (lixeira) | 9. <i>Hirtella glandulosa</i> (coco-de-bode) |
| 5. <i>Eugenia dysenterica</i> (cagaita) | 10. <i>Hymenaea martiana</i> (jatobá) |

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S
30	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

SETEMBRO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **OUTUBRO**

1. *Hirtella gracilipes* (bosta-de-cabra)
2. *Inga cylindrica* (ingá-feijão)
3. *Maprounea guianensis* (cascudinho)
4. *Ocotea spixiana* (canela)
5. *Protium ovatum* (almécega)

6. *Rourea induta* (botica-inteira)
7. *Tococa guianensis* (tococa-da-guiana)
8. *Virola sebifera* (bicuíba)
9. *Xylopia sericea* (pindaíba-vermelha)
10. *Zanthoxylum riedelianum* (maminha-de-porca)

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S
30	D	S	T	Q	Q	S	S
31	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

OUTUBRO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **NOVEMBRO**

1. *Agonandra brasiliensis* (cerveja-de-pobre)
2. *Anacardium humile* (cajuzinho-do-cerrado)
3. *Apeiba tibourbou* (pente-de-macaco)
4. *Cordia sessilis* (marmelada-de-cachorro)
5. *Duguetia furfuracea* (araticum-do-campo)

6. *Emmotum nitens* (pau-sobre)
7. *Erythrina speciosa* (corticeira-da-serra)
8. *Guapira noxia* (caparrosa)
9. *Hancornia speciosa* (mangaba)
10. *Tapura amazonica* (manguito)

1 D S T Q Q S S

2 D S T Q Q S S

3 D S T Q Q S S

4 D S T Q Q S S

5 D S T Q Q S S

6 D S T Q Q S S

7 D S T Q Q S S

8 D S T Q Q S S

9 D S T Q Q S S

10 D S T Q Q S S

11 D S T Q Q S S

12 D S T Q Q S S

13 D S T Q Q S S

14 D S T Q Q S S

15 D S T Q Q S S

16 D S T Q Q S S

17 D S T Q Q S S

18 D S T Q Q S S

19 D S T Q Q S S

20 D S T Q Q S S

21 D S T Q Q S S

22 D S T Q Q S S

23 D S T Q Q S S

24 D S T Q Q S S

25 D S T Q Q S S

26 D S T Q Q S S

27 D S T Q Q S S

28 D S T Q Q S S

29 D S T Q Q S S

30 D S T Q Q S S

ANO:

NOVEMBRO



Exemplos de espécies com frutos maduros em **DEZEMBRO**

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Campomanesia adamantium</i> (gabioba) | 6. <i>Miconia albicans</i> (pixirica) |
| 2. <i>Diospyros sericea</i> (caqui-da-mata) | 7. <i>Myrsine guianensis</i> (capororoca) |
| 3. <i>Erythroxylum daphnites</i> (muxiba) | 8. <i>Ouratea hexasperma</i> (vassoura-de-bruxa) |
| 4. <i>Eugenia klotzschiana</i> (pera-do-cerrado) | 9. <i>Pouteria ramiflora</i> (currióla) |
| 5. <i>Guarea guidonia</i> (peloteira) | 10. <i>Styrax ferrugineus</i> (laranjinha-do-campo) |

1	D	S	T	Q	Q	S	S
2	D	S	T	Q	Q	S	S
3	D	S	T	Q	Q	S	S
4	D	S	T	Q	Q	S	S
5	D	S	T	Q	Q	S	S
6	D	S	T	Q	Q	S	S
7	D	S	T	Q	Q	S	S
8	D	S	T	Q	Q	S	S
9	D	S	T	Q	Q	S	S
10	D	S	T	Q	Q	S	S
11	D	S	T	Q	Q	S	S
12	D	S	T	Q	Q	S	S
13	D	S	T	Q	Q	S	S
14	D	S	T	Q	Q	S	S
15	D	S	T	Q	Q	S	S
16	D	S	T	Q	Q	S	S

17	D	S	T	Q	Q	S	S
18	D	S	T	Q	Q	S	S
19	D	S	T	Q	Q	S	S
20	D	S	T	Q	Q	S	S
21	D	S	T	Q	Q	S	S
22	D	S	T	Q	Q	S	S
23	D	S	T	Q	Q	S	S
24	D	S	T	Q	Q	S	S
25	D	S	T	Q	Q	S	S
26	D	S	T	Q	Q	S	S
27	D	S	T	Q	Q	S	S
28	D	S	T	Q	Q	S	S
29	D	S	T	Q	Q	S	S
30	D	S	T	Q	Q	S	S
31	D	S	T	Q	Q	S	S

ANO:

DEZEMBRO

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em JANEIRO

Arbóreas

<i>Acrocomia aculeata</i> (macaúba)	<i>Erythrina cristagalli</i> (suinã)	<i>Matayba guianensis</i> (camboatá-branco)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)
<i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio)	<i>Erythrina verna</i> (canivete)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Salacia elliptica</i> (bacuri-da-mata)
<i>Alchornea glandulosa</i> (tapia)	<i>Eugenia klotzschiana</i> (pera-do-cerrado)	<i>Miconia burchellii</i> (pixirica)	<i>Sebastiania brasiliensis</i> (leiteiro-da-folha-fina)
<i>Alibertia edulis</i> (marmelada-de-cavalo)	<i>Eugenia pyriformis</i> (uvaia)	<i>Myrcia splendens</i> (araçazinho)	<i>Simarouba amara</i> (marupá)
<i>Anacardium occidentale</i> (cajueiro)	<i>Euterpe edulis</i> (açaí-do-cerrado)	<i>Myrcia tomentosa</i> (araçazinho)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Annona crassiflora</i> (araticum)	<i>Garcinia brasiliensis</i> (bacuri)	<i>Myrsine guianensis</i> (copororoca)	<i>Spondias tuberosa</i> (umbú)
<i>Attalea speciosa</i> (babaçu)	<i>Genipa americana</i> (jenipapeiro)	<i>Ocotea odorifera</i> (canela-sassafrás)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Bauhinia rufa</i> (pata-de-vaca)	<i>Guarea guidonia</i> (peloteira)	<i>Ormosia arborea</i> (coronheira)	<i>Talisia esculenta</i> (pitomba)
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (maria-preta)	<i>Handroanthus serratifolius</i> (ipê-amarelo)	<i>Ouratea hexasperma</i> (vassoura-de-bruxa)	<i>Tapirira guianensis</i> (fruta-de-pombo)
<i>Brosimum gaudichaudii</i> (mama-cadela)	<i>Inga laurina</i> (ingá-de-quatro-folhas)	<i>Ouratea spectabilis</i> (folha-de-serra)	<i>Tapirira obtusa</i> (fruta-de-pombo)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Inga sessilis</i> (ingá-macaco)	<i>Pera glabrata</i> (tamanqueira)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (murici-de-tabuleiro)	<i>Inga vera</i> (ingá)	<i>Persea wilddenovii</i> (pau-de-andrade)	<i>Trema micrantha</i> (grandiúva)
<i>Caryocar brasiliense</i> (pequizeiro)	<i>Leptolobium dasycarpum</i> (chapadinha)	<i>Platymiscium floribundum</i> (jacarandá-do-litoral)	<i>Triplaris americana</i> (pau-formiga)
<i>Cecropia glaziovii</i> (imbaúba-vermelha)	<i>Leptolobium elegans</i> (genciana)	<i>Pleroma candolleana</i> (quaresmeira-da-serra)	<i>Vachellia farnesiana</i> (acácia)
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (bacupari-da-mata)	<i>Licania rigida</i> (oiti)	<i>Pouteria ramiflora</i> (currióla)	<i>Vatairea macrocarpa</i> (amargosa)
<i>Diospyros hispida</i> (caquizeiro-do-cerrado)	<i>Lithraea molleoides</i> (aroeira-branca)	<i>Pouteria torta</i> (currióla)	<i>Vitex polygama</i> (tarumã-do-cerrado)
<i>Diospyros sericea</i> (caqui-da-mata)	<i>Mabea fistulifera</i> (canudeiro)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Emmotum nitens</i> (pau-sobre)	<i>Maclura tinctoria</i> (amoreira)	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> (cafezinho)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon selloanus</i> (capim-pluma-branca)	<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Mesosetum loliiforme</i> (capim-canivete)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)
<i>Aristida setifolia</i> (capim-panasco)	<i>Calea gardneriana</i> (margaridinha)	<i>Parinari obtusifolia</i> (fruta-de-ema)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)
<i>Axonopus brasiliensis</i> (grama-brasil)	<i>Campomanesia adamantium</i> (gabiroba)	<i>Paspalum carinatum</i> (capim-carinato)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)
<i>Axonopus capillaris</i> (grama-capilosa)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Paspalum convexum</i> (capim-convexo)	<i>Setaria parviflora</i> (capim-canoa)
<i>Axonopus pellitus</i> (grama-pelita)	<i>Connarus suberosus</i> (araruta-do-campo)	<i>Paspalum gardnerianum</i> (capim-gardineiro)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Paspalum reduncum</i> (capim-reduco)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em FEVEREIRO

Arbóreas

<i>Aegiphila integrifolia</i> (tamanqueiro)	<i>Croton urucurana</i> (urucurana)	<i>Miconia burchellii</i> (pixirica)	<i>Spondias tuberosa</i> (umbú)
<i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio)	<i>Diospyros hispida</i> (caquizeiro-do-cerrado)	<i>Myrcia splendens</i> (araçazinho)	<i>Swartzia langsdorffii</i> (banha-de-galinha)
<i>Alibertia edulis</i> (marmelada-de-cavalo)	<i>Euterpe edulis</i> (açai-do-cerrado)	<i>Ocotea odorifera</i> (canela-sassafrás)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Annona crassiflora</i> (araticum)	<i>Genipa americana</i> (jenipapeiro)	<i>Persea wilddenovii</i> (pau-de-andrade)	<i>Talisia esculenta</i> (pitomba)
<i>Bauhinia rufa</i> (pata-de-vaca)	<i>Guarea guidonia</i> (peloteira)	<i>Pleroma candolleana</i> (quaresmeira-da-serra)	<i>Tapirira guianensis</i> (fruta-de-pombo)
<i>Bixa orellana</i> (urucum)	<i>Inga sessilis</i> (ingá-macaco)	<i>Pouteria ramiflora</i> (currióla)	<i>Tapirira obtusa</i> (fruta-de-pombo)
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (maria-preta)	<i>Inga vera</i> (ingá)	<i>Pouteria torta</i> (currióla)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Brosimum rubescens</i> (falso-pau-brasil)	<i>Jacaratia spinosa</i> (jacaratia)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)	<i>Trema micrantha</i> (grandiúva)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Leptolobium dasycarpum</i> (chapadinha)	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> (cafezinho)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (murici-de-tabuleiro)	<i>Leptolobium elegans</i> (genciana)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)	<i>Vitex polygama</i> (tarumã-do-cerrado)
<i>Caryocar brasiliense</i> (pequizeiro)	<i>Licania rigida</i> (oiti)	<i>Sebastiania brasiliensis</i> (leiteiro-da-folha-fina)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Caryocar villosum</i> (piquiá)	<i>Lithraea molleoides</i> (aroeira-branca)	<i>Siparuna guianensis</i> (limão-bravo)	
<i>Cecropia glaziovii</i> (imbaúba-vermelha)	<i>Matayba guianensis</i> (camboatá-branco)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)	
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (bacupari-da-mata)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Spondias mombin</i> (taperebá)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon selloanus</i> (capim-pluma-branca)	<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Parinari obtusifolia</i> (fruta-de-ema)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)
<i>Annona montana</i> (jaca-de-pobre)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Paspalum convexum</i> (capim-convexo)	<i>Schizachyrium tenerum</i> (capim-vermelho)
<i>Aristida setifolia</i> (capim-panasco)	<i>Connarus suberosus</i> (araruta-do-campo)	<i>Paspalum erianthum</i> (capim-branco)	<i>Setaria parviflora</i> (capim-canoa)
<i>Axonopus brasiliensis</i> (grama-brasil)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Paspalum gardnerianum</i> (capim-gardineiro)	<i>Tibouchina gracilis</i> (quaresmeira)
<i>Axonopus capillaris</i> (grama-capilosa)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Axonopus pellitus</i> (grama-pelita)	<i>Gomphrena arborescens</i> (para-tudo)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Lavoisiera cordata</i> (rosa-branca)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)	
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Mesosetum loliiforme</i> (capim-canivete)	<i>Saccharum asperum</i> (capim-aspero)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em MARÇO

Arbóreas

<i>Aegiphila integrifolia</i> (tamanqueiro)	<i>Celtis pubescens</i> (grão-de-galo)	<i>Matayba guianensis</i> (camboatá-branco)	<i>Talisia esculenta</i> (pitomba)
<i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio)	<i>Croton urucurana</i> (urucurana)	<i>Myrcia splendens</i> (araçazinho)	<i>Tapirira guianensis</i> (fruta-de-pombo)
<i>Agarista chapadensis</i> (criúva)	<i>Diospyros hispida</i> (caquizeiro-do-cerrado)	<i>Ocotea odorifera</i> (canela-sassafrás)	<i>Tapirira obtusa</i> (fruta-de-pombo)
<i>Annona coriacea</i> (marolo)	<i>Genipa americana</i> (jenipapeiro)	<i>Peltophorum dubium</i> (canafístula)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Annona crassiflora</i> (araticum)	<i>Guettarda viburnoides</i> (veludo-branco)	<i>Persea willdenovii</i> (pau-de-andrade)	<i>Tocoyena formosa</i> (jenipapo-de-cavalo)
<i>Bauhinia rufa</i> (pata-de-vaca)	<i>Inga sessilis</i> (ingá-macaco)	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> (cafezinho)	<i>Trema micrantha</i> (grandiúva)
<i>Bixa orellana</i> (urucum)	<i>Inga vera</i> (ingá)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (maria-preta)	<i>Jacaratia spinosa</i> (jacaratia)	<i>Siparuna guianensis</i> (limão-bravo)	<i>Vitex polygama</i> (tarumã-do-cerrado)
<i>Brosimum rubescens</i> (falso-pau-brasil)	<i>Lafoensia pacari</i> (pacari)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)	<i>Vochysia pyramidalis</i> (gomeira-de-macaco)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Lecythis pisonis</i> (sapucaia-vermelha)	<i>Spondias mombin</i> (taperebá)	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> (maminha-de-porca)
<i>Cardiopetalum calophyllum</i> (embira)	<i>Leptolobium dasycarpum</i> (amargoso)	<i>Spondias tuberosa</i> (umbú)	
<i>Caryocar villosum</i> (piquiá)	<i>Leptolobium elegans</i> (genciana)	<i>Swartzia langsdorffii</i> (banha-de-galinha)	
<i>Celtis iguanaea</i> (juá-mirim)	<i>Licania rigida</i> (oiti)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon selloanus</i> (capim-pluma-branca)	<i>Ctenium chapadense</i> (capim-da-chapada)	<i>Parinari obtusifolia</i> (fruta-de-ema)	<i>Schizachyrium tenerum</i> (capim-vermelho)
<i>Annona montana</i> (jaca-de-pobre)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Paspalum erianthum</i> (capim-branco)	<i>Setaria parviflora</i> (capim-canoa)
<i>Aristida setifolia</i> (capim-panasco)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Paspalum gardnerianum</i> (capim-gardineiro)	<i>Setaria poiretiana</i> (capim-canoão)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Gomphrena arborescens</i> (para-tudo)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	<i>Tibouchina gracilis</i> (quaresmeira)
<i>Axonopus brasiliensis</i> (grama-brasil)	<i>Gymnopogon spicatus</i> (capim-espicato)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	<i>Trichantheium cyanescens</i> (capim-cianense)
<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Lavoisiera cordata</i> (rosa-branca)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Mesosetum loliiforme</i> (capim-canivete)	<i>Saccharum asperum</i> (capim-aspero)	
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em ABRIL

Arbóreas

<i>Aegiphila integrifolia</i> (tamanqueiro)	<i>Celtis iguanaea</i> (juá-mirim)	<i>Machaerium hirtum</i> (barreiro)	<i>Tachigali rugosa</i> (carvoeiro)
<i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio)	<i>Celtis pubescens</i> (grão-de-galo)	<i>Machaerium opacum</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Agarista chapadensis</i> (criúva)	<i>Combretum duarteanum</i> (caatinga-branca)	<i>Myrsine umbellata</i> (copororoca)	<i>Tocoyena formosa</i> (jenipapo-de-cavalo)
<i>Annona coriacea</i> (marolo)	<i>Croton urucurana</i> (urucurana)	<i>Peltophorum dubium</i> (canafístula)	<i>Trema micrantha</i> (grandiúva)
<i>Annona crassiflora</i> (araticum)	<i>Diospyros hispida</i> (caquizeiro-do-cerrado)	<i>Pleroma granulosa</i> (quaresmeira)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Apuleia leiocarpa</i> (amarelão)	<i>Guettarda viburnoides</i> (veludo-branco)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)	<i>Vitex polygama</i> (tarumã-do-cerrado)
<i>Bixa orellana</i> (urucum)	<i>Inga sessilis</i> (ingá-macaco)	<i>Schinus terebinthifolius</i> (aroeira-pimenteira)	<i>Vochysia pyramidalis</i> (gomeira-de-macaco)
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (maria-preta)	<i>Inga vera</i> (ingá)	<i>Siparuna guianensis</i> (limão-bravo)	<i>Vochysia thyrsoidea</i> (gomeira)
<i>Brosimum rubescens</i> (falso-pau-brasil)	<i>Lafoensia pacari</i> (pacari)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)	<i>Xylopia aromatica</i> (pimenta-de-macaco)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Lecythis pisonis</i> (sapucaia-vermelha)	<i>Spondias mombin</i> (taperebá)	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> (maminha-de-porca)
<i>Cardiopetalum calophyllum</i> (embira)	<i>Leptolobium dasycarpum</i> (amargoso)	<i>Swartzia langsdorffii</i> (banha-de-galinha)	
<i>Caryocar villosum</i> (piquiá)	<i>Leptolobium elegans</i> (genciana)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon selloanus</i> (capim-pluma-branca)	<i>Ctenium chapadense</i> (capim-da-chapada)	<i>Parinari obtusifolia</i> (fruta-de-ema)	<i>Schizachyrium tenerum</i> (capim-vermelho)
<i>Annona montana</i> (jaca-de-pobre)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Paspalum erianthum</i> (capim-branco)	<i>Setaria parviflora</i> (capim-canoa)
<i>Aristida setifolia</i> (capim-panasco)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Paspalum gardnerianum</i> (capim-gardineiro)	<i>Setaria poiretiana</i> (capim-canoão)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Gomphrena arborescens</i> (para-tudo)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	<i>Tibouchina gracilis</i> (quaresmeira)
<i>Axonopus brasiliensis</i> (grama-brasil)	<i>Gymnopogon spicatus</i> (capim-espicato)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	<i>Trichantheium cyanescens</i> (capim-cianense)
<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Lavoisiera cordata</i> (rosa-branca)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Mesosetum loliiforme</i> (capim-canivete)	<i>Saccharum asperum</i> (capim-aspero)	
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em MAIO

Arbóreas

<i>Aegiphila integrifolia</i> (tamanqueiro)	<i>Celtis pubescens</i> (grão-de-galo)	<i>Lafoensia pacari</i> (pacari)	<i>Schinus terebinthifolius</i> (aroeira-pimenteira)
<i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio)	<i>Combretum duarteanum</i> (caatinga-branca)	<i>Leptolobium dasycarpum</i> (amargoso)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Annona coriacea</i> (marolo)	<i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha)	<i>Leptolobium elegans</i> (genciana)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Apuleia leiocarpa</i> (amarelão)	<i>Croton urucurana</i> (urucurana)	<i>Machaerium acutifolium</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Tachigali rugosa</i> (carvoeiro)
<i>Bixa orellana</i> (urucum)	<i>Cybistax antispyhilitica</i> (ipê-verde)	<i>Machaerium hirtum</i> (barreiro)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Dalbergia miscolobium</i> (jacarandá-do-cerrado)	<i>Machaerium opacum</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Trema micrantha</i> (grandiúva)
<i>Calophyllum brasiliense</i> (landim)	<i>Enterolobium gummiferum</i> (orelha-de-macaco)	<i>Myrsine umbellata</i> (copororoca)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Caryocar villosum</i> (piquiá)	<i>Guettarda viburnoides</i> (veludo-branco)	<i>Pleroma granulosa</i> (quaresmeira)	<i>Vochysia thyrsoidea</i> (gomeira)
<i>Cecropia pachystachya</i> (imbaúba-cinzenta)	<i>Inga edulis</i> (inga-de-metro)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)	<i>Xylopia aromatica</i> (pimenta-de-macaco)

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon bicornis</i> (capim-rabo-de-cavalo)	<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Lepidaploa aurea</i> (chapadinha)	<i>Setaria poiretiana</i> (capim-canoão)
<i>Andropogon fastigiatus</i> (capim-andropogon)	<i>Bromelia balansae</i> (gravatá)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)
<i>Andropogon leucostachyus</i> (capim-membeca)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Paspalum erianthum</i> (capim-branco)	<i>Tibouchina gracilis</i> (quaresmeira)
<i>Aristida gibbosa</i> (capim-giboso)	<i>Ctenium chapadense</i> (capim-da-chapada)	<i>Paspalum stellatum</i> (capim-estrela)	<i>Trichantheium cyanescens</i> (capim-cianense)
<i>Aristida recurvata</i> (capim-recurvado)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	<i>Vellozia epidendroides</i> (canela-de-ema)
<i>Aspilia foliacea</i> (margarida-do-campo)	<i>Gomphrena arborescens</i> (para-tudo)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Axonopus brasiliensis</i> (grama-brasil)	<i>Gymnopogon spicatus</i> (capim-espicato)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)	<i>Xyris platystachya</i> (sempre-viva)
<i>Axonopus marginatus</i> (grama-margiada)	<i>Helicteres sacarolha</i> (sacarolha)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)	<i>Zeyheria montana</i> (bolsa-de-pastor)
<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Jacaranda caroba</i> (jacarandá)	<i>Schizachyrium tenerum</i> (capim-vermelho)	
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Jacaranda ulei</i> (carobinha-do-campo)	<i>Setaria parviflora</i> (capim-canoa)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em JUNHO

Arbóreas

<i>Aegiphila integrifolia</i> (tamanqueiro)	<i>Celtis pubescens</i> (grão-de-galo)	<i>Machaerium acutifolium</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Aegiphila verticillata</i> (fruta-de-papagaio)	<i>Combretum duarteanum</i> (caatinga-branca)	<i>Machaerium hirtum</i> (barreiro)	<i>Sterculia striata</i> (chichá-do-cerrado)
<i>Apuleia leiocarpa</i> (amarelão)	<i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha)	<i>Machaerium opacum</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (barbatimão)
<i>Bixa orellana</i> (urucum)	<i>Croton urucurana</i> (urucurana)	<i>Metrodorea stipularis</i> (chupa-ferro)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Byrsonima basiloba</i> (murici-de-ema)	<i>Cybistax antisiphilitica</i> (ipê-verde)	<i>Myrsine umbellata</i> (copororoca)	<i>Tachigali rugosa</i> (carvoeiro)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Dalbergia miscolobium</i> (jacarandá-do-cerrado)	<i>Parkia pendula</i> (fava-de-bolota)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Callisthene major</i> (itapiúna)	<i>Enterolobium gummiferum</i> (orelha-de-macaco)	<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (cambará-do-campo)	<i>Vochysia thyrsoidea</i> (gomeira)
<i>Calophyllum brasiliense</i> (landim)	<i>Himatanthus obovatus</i> (vaca-leiteira)	<i>Pterodon emarginatus</i> (sucupira-branca-roxa)	<i>Xylopia aromatica</i> (pimenta-de-macaco)
<i>Casearia sylvestris</i> (caferane)	<i>Inga edulis</i> (inga-de-metro)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)	<i>Xylopia emarginata</i> (pindaíba-preta)
<i>Cecropia pachystachya</i> (imbaúba-cinzenta)	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (pau-carrapato)	<i>Schinus terebinthifolius</i> (aroeira-pimenteira)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon bicornis</i> (capim-rabo-de-cavalo)	<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	<i>Vellozia epidendroides</i> (canela-de-ema)
<i>Andropogon fastigiatus</i> (capim-andropogon)	<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	<i>Vellozia squamata</i> (canela-de-ema)
<i>Andropogon leucostachyus</i> (capim-membeca)	<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Aristida gibbosa</i> (capim-giboso)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)	<i>Xyris platystachya</i> (sempre-viva)
<i>Aristida recurvata</i> (capim-recurvado)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)	<i>Xyris trachyphylla</i> (sempre-viva)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Helicteres sacarolha</i> (sacarolha)	<i>Schizachyrium sanguineum</i> (capim-roxo)	<i>Zeyheria montana</i> (bolsa-de-pastor)
<i>Aspilia foliacea</i> (margarida-do-campo)	<i>Heteropterys pteropetala</i> (murici-macho)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (pau-jangada)
<i>Axonopus brasiliensis</i> (grama-brasil)	<i>Jacaranda caroba</i> (jacarandá)	<i>Tibouchina gracilis</i> (quaresmeira)	
<i>Axonopus pressus</i> (grama-do-cerrado)	<i>Jacaranda ulei</i> (carobinha-do-campo)	<i>Trichantheium cyanescens</i> (capim-cianense)	
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Lepidaploa aurea</i> (chapadinha)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em JULHO

Arbóreas

<i>Byrsonima basiloba</i> (murici-de-ema)	<i>Cybistax antisiphilitica</i> (ipê-verde)	<i>Metrodorea stipularis</i> (chupa-ferro)	<i>Sterculia striata</i> (chichá-do-cerrado)
<i>Byrsonima crassifolia</i> (murici-pitanga)	<i>Dalbergia miscolobium</i> (jacarandá-do-cerrado)	<i>Mouriri pusa</i> (puçá)	<i>Strychnos pseudoquina</i> (quina-do-cerrado)
<i>Callisthene fasciculata</i> (carvão-branco)	<i>Dimorphandra mollis</i> (faveira-do-cerrado)	<i>Myrsine umbellata</i> (copororoca)	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (barbatimão)
<i>Callisthene major</i> (itapiúna)	<i>Enterolobium gummiferum</i> (orelha-de-macaco)	<i>Parkia pendula</i> (fava-de-bolota)	<i>Syagrus flexuosa</i> (coquinho-babão)
<i>Calophyllum brasiliense</i> (landim)	<i>Gallesia integrifolia</i> (pau-d'alho)	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (pau-jacaré)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Casearia sylvestris</i> (caferane)	<i>Himatanthus obovatus</i> (vaca-leiteira)	<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (cambará-do-campo)	<i>Tachigali aurea</i> (carvoeiro)
<i>Cecropia pachystachya</i> (imbaúba-cinzenta)	<i>Hymenaea courbaril</i> (jatobá-da-mata)	<i>Pseudobombax longiflorum</i> (embiruçu)	<i>Tachigali rugosa</i> (carvoeiro)
<i>Cedrela fissilis</i> (cedrinho)	<i>Hymenaea martiana</i> (jatobá)	<i>Pseudobombax tomentosum</i> (embiruçu-peludo)	<i>Terminalia argentea</i> (capitão-do-campo)
<i>Ceiba glaziovii</i> (barriguda)	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> (jatobá-do-cerrado)	<i>Pterodon emarginatus</i> (sucupira-branca-roxa)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Centrolobium tomentosum</i> (araribá)	<i>Kielmeyera speciosa</i> (pau-santo)	<i>Pterodon pubescens</i> (sucupira-branca-rosa)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Combretum duarteanum</i> (caatinga-branca)	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (pau-carrapato)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)	<i>Xylopia aromatica</i> (pimenta-de-macaco)
<i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha)	<i>Machaerium acutifolium</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Schinus terebinthifolius</i> (aroeira-pimenteira)	<i>Xylopia emarginata</i> (pindaíba-preta)
<i>Cordia trichotoma</i> (freijó)	<i>Machaerium hirtum</i> (barreiro)	<i>Senna macranthera</i> (fedegosão)	
<i>Croton urucurana</i> (urucurana)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Andropogon bicornis</i> (capim-rabo-de-cavalo)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Mimosa clausсенii</i> (mimosa)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Andropogon leucostachyus</i> (capim-membraca)	<i>Davilla elliptica</i> (lixerinha)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	<i>Vellozia squamata</i> (canela-de-ema)
<i>Aristida recurvata</i> (capim-recurvado)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Eremanthus erythropappus</i> (candeia)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	<i>Xyris trachyphylla</i> (sempre-viva)
<i>Axonopus pressus</i> (grama-do-cerrado)	<i>Helicteres sacarolha</i> (sacarolha)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)	<i>Zeyheria montana</i> (bolsa-de-pastor)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Heteropterys pteropetala</i> (murici-macho)	<i>Schizachyrium sanguineum</i> (capim-roxo)	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (pau-jangada)
<i>Baccharis dracunculifolia</i> (alecrim-do-campo)	<i>Jacaranda caroba</i> (jacarandá)	<i>Senna alata</i> (manjerioba-grande)	
<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Lepidaploa aurea</i> (amargoso)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)	
<i>Cenchrus brownii</i> (carrapixo)	<i>Loudetiopsis chrysothrix</i> (capim-brinco)	<i>Tibouchina gracilis</i> (quaresmeira)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em AGOSTO

Arbóreas

<i>Aspidosperma discolor</i> (guatambu-carapanaúba)	<i>Cedrela fissilis</i> (cedrinho)	<i>Jacaranda cuspidifolia</i> (jacarandá)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> (peroba-mico)	<i>Ceiba glaziovii</i> (barriguda)	<i>Kielmeyera lathrophyton</i> (pau-santo-da-serra)	<i>Qualea grandiflora</i> (pau-terra)
<i>Aspidosperma melanocalyx</i> (guatambu-cascuda)	<i>Ceiba speciosa</i> (paineira)	<i>Kielmeyera rubriflora</i> (rosa-do-campo)	<i>Qualea parviflora</i> (pau-terrinha)
<i>Aspidosperma parvifolium</i> (guatambu-branco)	<i>Centrolobium tomentosum</i> (araribá)	<i>Kielmeyera speciosa</i> (pau-santo)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)
<i>Aspidosperma polyneuron</i> (guatambu-amargoso)	<i>Clusia criuva</i> (gameleira)	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (pau-carrapato)	<i>Salvertia convallariodora</i> (chapéu-de-couro)
<i>Aspidosperma pyrifolium</i> (guatambu-pereiro)	<i>Combretum duarteanum</i> (caatinga-branca)	<i>Machaerium acutifolium</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Schefflera morototoni</i> (morototó)
<i>Aspidosperma tomentosum</i> (peroba-do-cerrado)	<i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha)	<i>Magnolia ovata</i> (magnólia-do-brejo)	<i>Senegalia polyphylla</i> (espinehiro-preto)
<i>Attalea phalerata</i> (babaçu)	<i>Cordia trichotoma</i> (freijó)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Senna macranthera</i> (fedegoso)
<i>Attalea speciosa</i> (babaçu)	<i>Cybistax antispyhilitica</i> (ipê-verde)	<i>Mouriri pusa</i> (puçá)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Bowdichia virgilioides</i> (sucupira-preta)	<i>Dalbergia miscolobium</i> (jacarandá-do-cerrado)	<i>Myracrodruon urundeuva</i> (aroeira)	<i>Sterculia striata</i> (chichá-do-cerrado)
<i>Buchenavia tomentosa</i> (pau-pilão)	<i>Dimorphandra mollis</i> (faveira-do-cerrado)	<i>Myrsine umbellata</i> (capororoca)	<i>Strychnos pseudoquina</i> (quina-do-cerrado)
<i>Byrsonima basiloba</i> (murici-de-ema)	<i>Dipteryx alata</i> (baru)	<i>Ormosia fastigiata</i> (tento)	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (barbatimão)
<i>Byrsonima crassifolia</i> (murici-pitanga)	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (tamboril)	<i>Parkia pendula</i> (fava-de-bolota)	<i>Syagrus flexuosa</i> (coquinho-babão)
<i>Cabralea canjerana</i> (canjerana)	<i>Enterolobium gummiferum</i> (orelha-de-macaco)	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (pau-jacaré)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Callisthene fasciculata</i> (carvão-branco)	<i>Eriotheca pubescens</i> (paineira-do-cerrado)	<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (cambará-do-campo)	<i>Tachigali aurea</i> (carvoeiro)
<i>Callisthene major</i> (itapiúna)	<i>Gallsia integrifolia</i> (pau-d'alho)	<i>Pseudobombax longiflorum</i> (embiruçu-do-mato)	<i>Terminalia argentea</i> (capitão-do-campo)
<i>Calophyllum brasiliense</i> (landim)	<i>Guazuma ulmifolia</i> (mutamba)	<i>Pseudobombax tomentosum</i> (embiruçu-peludo)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Casearia sylvestris</i> (caferane)	<i>Hymenaea courbaril</i> (jatobá-da-mata)	<i>Pterodon emarginatus</i> (sucupira-branca-da-flor-roxa)	<i>Triplaris gardneriana</i> (novateiro-preto)
<i>Cassia ferruginea</i> (cássia)	<i>Hymenaea martiana</i> (jatobá)	<i>Pterodon pubescens</i> (sucupira-branca-da-flor-rosa)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Cecropia pachystachya</i> (imbaúba-cinzenta)	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> (jatobá-do-cerrado)	<i>Pterogyne nitens</i> (pau-amendoim)	<i>Xylopia emarginata</i> (pindaíba-preta)

Arbustivas e Herbáceas

<i>Achyrocline satureioides</i> (macela)	<i>Cochlospermum regium</i> (algodão-bravo)	<i>Lepidaploa aurea</i> (chapadinha)	<i>Syngonanthus nitens</i> (capim-dourado)
<i>Andropogon bicornis</i> (capim-rabo-de-cavalo)	<i>Davilla elliptica</i> (lixerinha)	<i>Loudetiopsis chrysothrix</i> (capim-brinco)	<i>Vellozia squamata</i> (canela-de-ema)
<i>Aristida recurvata</i> (capim-recurvado)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Mimosa clausenii</i> (mimosa)	<i>Zeyheria montana</i> (bolsa-de-pastor)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (pau-jangada)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Eremanthus erythropappus</i> (candeia)	<i>Passiflora cincinnata</i> (maracujá-do-cerrado)	
<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Helicteres sacarolha</i> (sacarolha)	<i>Passiflora setacea</i> (maracujá-sururuca)	
<i>Calliandra dysantha</i> (caliandra)	<i>Heteropterys pteropetala</i> (murici-macho)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)	
<i>Cenchrus brownii</i> (carrapixo)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Senna alata</i> (manjerioba-grande)	
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Jacaranda caroba</i> (jacarandá)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em SETEMBRO

Arbóreas

<i>Acrocomia aculeata</i> (macaúba)	<i>Cecropia pachystachya</i> (imbaúba-cinzenta)	<i>Hymenaea courbaril</i> (jatobá-da-mata)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)
<i>Albizia niopoides</i> (farinha-seca)	<i>Cedrela fissilis</i> (cedrinho)	<i>Hymenaea martiana</i> (jatobá)	<i>Qualea grandiflora</i> (pau-terra)
<i>Alchornea glandulosa</i> (tapia)	<i>Ceiba speciosa</i> (paineira)	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> (jatobá-do-cerrado)	<i>Qualea parviflora</i> (pau-terrinha)
<i>Alchornea triplinervia</i> (tanheiro)	<i>Centrolobium tomentosum</i> (araribá)	<i>Inga cylindrica</i> (ingá-feijão)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)
<i>Amburana cearensis</i> (ambaurana)	<i>Clusia criuva</i> (gameleira)	<i>Jacaranda brasiliana</i> (jacarandá)	<i>Rourea induta</i> (botica-inteira)
<i>Anacardium occidentale</i> (cajueiro)	<i>Combretum duarteanum</i> (caatinga-branca)	<i>Jacaranda cuspidifolia</i> (jacarandá)	<i>Salvertia convallariodora</i> (chapéu-de-couro)
<i>Anadenanthera colubrina</i> (angico-branco)	<i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha)	<i>Kielmeyera coriacea</i> (pau-santo)	<i>Schefflera morototoni</i> (morototó)
<i>Anadenanthera peregrina</i> (angico-preto)	<i>Cordia glabrata</i> (peteribi)	<i>Kielmeyera lathrophyton</i> (pau-santo-da-serra)	<i>Senegalia polyphylla</i> (espinehiro-preto)
<i>Aspidosperma discolor</i> (guatambu-carapanaúba)	<i>Cordia sellowiana</i> (juruté)	<i>Kielmeyera rubriflora</i> (rosa-do-campo)	<i>Senna multijuga</i> (aleluia-amarela)
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> (peroba-mico)	<i>Cordia trichotoma</i> (freijó)	<i>Kielmeyera speciosa</i> (pau-santo)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Aspidosperma melanocalyx</i> (guatambu-peroba-cascuda)	<i>Curatella americana</i> (lixreira)	<i>Luehea candicans</i> (açoita-cavalo)	<i>Sterculia striata</i> (chichá-do-cerrado)
<i>Aspidosperma parvifolium</i> (guatambu-branco)	<i>Cybistax antisyphilitica</i> (ipê-verde)	<i>Luehea paniculata</i> (açoita-cavalo)	<i>Strychnos pseudoquina</i> (quina-do-cerrado)
<i>Aspidosperma polyneuron</i> (guatambu-amargoso)	<i>Dalbergia miscolobium</i> (jacarandá-do-cerrado)	<i>Machaerium acutifolium</i> (jacarandá-do-campo)	<i>Syagrus flexuosa</i> (coquinho-babão)
<i>Aspidosperma pyrifolium</i> (guatambu-pereiro)	<i>Dilodendron bipinnatum</i> (maria-pobre)	<i>Magnolia ovata</i> (magnólia-do-brejo)	<i>Syagrus oleracea</i> (gueroba)
<i>Aspidosperma subincanum</i> (guatambu-vermelho)	<i>Dimorphandra mollis</i> (faveira-do-cerrado)	<i>Magonia pubescens</i> (tingui)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Aspidosperma tomentosum</i> (peroba-do-cerrado)	<i>Dipteryx alata</i> (baru)	<i>Maprounea guianensis</i> (cascudinho)	<i>Tabebuia aurea</i> (ipê-caraíba)
<i>Astronium fraxinifolium</i> (jequirá)	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (tamboril)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Tabebuia roseoalba</i> (ipê-branco)
<i>Attalea phalerata</i> (babaçu)	<i>Eriotheca gracilipes</i> (paineira)	<i>Mouriri pusa</i> (puçá)	<i>Tachigali subvelutina</i> (carvoeiro)
<i>Attalea speciosa</i> (babaçu)	<i>Eriotheca pubescens</i> (paineira-do-cerrado)	<i>Myracrodruon urundeuva</i> (aroeira)	<i>Tapura amazonica</i> (manguito)
<i>Bowdichia virgilioides</i> (sucupira-preta)	<i>Eugenia dysenterica</i> (cagaita)	<i>Myrsine umbellata</i> (capororoca)	<i>Terminalia argentea</i> (capitão-do-campo)
<i>Brosimum gaudichaudii</i> (mama-cadela)	<i>Eugenia florida</i> (guamirim)	<i>Ocotea spixiana</i> (canela)	<i>Tococa guianensis</i> (tococa-da-guiana)
<i>Buchenavia tomentosa</i> (pau-pilão)	<i>Euterpe edulis</i> (açaí-do-cerrado)	<i>Ormosia fastigiata</i> (tento)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Byrsonima basiloba</i> (murici-de-ema)	<i>Gallesia integrifolia</i> (pau-d'alho)	<i>Parkia platycephala</i> (fava-de-bolota)	<i>Triplaris gardneriana</i> (novateiro-preto)
<i>Byrsonima crassifolia</i> (murici-pitanga)	<i>Garcinia brasiliensis</i> (bacuri)	<i>Physocalymma scaberrimum</i> (cega-machado)	<i>Virola sebifera</i> (bicuiba)
<i>Cabralea canjerana</i> (canjerana)	<i>Guazuma ulmifolia</i> (mutamba)	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (pau-jacaré)	<i>Vochysia elliptica</i> (pau-doce)
<i>Callisthene fasciculata</i> (carvão-branco)	<i>Hancornia speciosa</i> (mangaba)	<i>Platymiscium floribundum</i> (jacarandá-do-litoral)	<i>Vochysia rufa</i> (pau-doce)
<i>Callisthene major</i> (itapiúna)	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (ipê-dourado)	<i>Platypodium elegans</i> (canzileiro)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Cariniana rubra</i> (jequitibá-vermelho)	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (ipê-rosa)	<i>Pseudobombax longiflorum</i> (embiruçu-do-mato)	<i>Xylopia emarginata</i> (pindaíba-preta)
<i>Casearia rupestris</i> (guaçantuba-grande)	<i>Handroanthus ochraceus</i> (ipê-do-cerrado)	<i>Pseudobombax tomentosum</i> (embiruçu-peludo)	<i>Xylopia sericea</i> (pindaíba-vermelha)
<i>Casearia sylvestris</i> (caferana)	<i>Handroanthus serratifolius</i> (ipê-amarelo)	<i>Pterodon emarginatus</i> (sucupira-branca-da-flor-roxa)	<i>Zanthoxylum riedelianum</i> (maminha-de-porca)
<i>Cassia ferruginea</i> (cássia)	<i>Hirtella glandulosa</i> (coco-de-bode)	<i>Pterodon pubescens</i> (sucupira-branca-da-flor-rosa)	
	<i>Hirtella gracilipes</i> (bosta-de-cabra)	<i>Pterogyne nitens</i> (pau-amendoim)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Achyrocline satureioides</i> (macela)	<i>Cenchrus brownii</i> (carrapixo)	<i>Heteropterys pteropetala</i> (murici-macho)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)
<i>Andropogon bicornis</i> (capim-rabo-de-cavalo)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Senna alata</i> (manjerioba-grande)
<i>Aristida recurvata</i> (capim-recurvado)	<i>Cochlospermum regium</i> (algodão-bravo)	<i>Jacaranda caroba</i> (jacarandá)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)
<i>Aristida torta</i> (capim-torto)	<i>Davilla elliptica</i> (lixeirinha)	<i>Lepidaploa aurea</i> (chapadinha)	<i>Syngonanthus nitens</i> (capim-dourado)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Loudetiopsis chrysothrix</i> (capim-brinco)	<i>Vellozia squamata</i> (canela-de-ema)
<i>Bidens gardneri</i> (picão-vermelho)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Mimosa clausenii</i> (mimosa)	<i>Zeyheria montana</i> (bolsa-de-pastor)
<i>Calea gardneriana</i> (margaridinha)	<i>Eremanthus erythropappus</i> (candeia)	<i>Paepalanthus chiquitensis</i> (chuveirinho)	
<i>Calliandra dysantha</i> (caliandra)	<i>Helicteres sacarolha</i> (sacarolha)	<i>Protium ovatum</i> (almécega)	

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em OUTUBRO

Arbóreas

<i>Acrocomia aculeata</i> (macaúba)	<i>Cordia sellowiana</i> (jurutê)	<i>Hymenaea martiana</i> (jatobá)	<i>Pseudobombax tomentosum</i> (embiruçu-peludo)
<i>Albizia niopoides</i> (farinha-seca)	<i>Cordia trichotoma</i> (freijó)	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> (jatobá-do-cerrado)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)
<i>Alchornea glandulosa</i> (tapiá)	<i>Curatella americana</i> (lixeira)	<i>Inga cylindrica</i> (ingá-feijão)	<i>Qualea parviflora</i> (pau-terrinha)
<i>Alchornea triplinervia</i> (tanheiro)	<i>Cybistax antispyhilitica</i> (ipê-verde)	<i>Jacaranda brasiliiana</i> (jacarandá)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)
<i>Amburana cearensis</i> (ambaurana)	<i>Dalbergia miscolobium</i> (jacarandá-do-cerrado)	<i>Jacaranda cuspidifolia</i> (jacarandá)	<i>Rourea induta</i> (botica-inteira)
<i>Anacardium occidentale</i> (cajueiro)	<i>Dilodendron bipinnatum</i> (maria-pobre)	<i>Kielmeyera coriacea</i> (pau-santo)	<i>Schefflera morototoni</i> (morototó)
<i>Anadenanthera colubrina</i> (angico-branco)	<i>Dipteryx alata</i> (baru)	<i>Lamanonia brasiliensis</i> (cangalheiro)	<i>Schinopsis brasiliensis</i> (quebracho-colorado)
<i>Anadenanthera peregrina</i> (angico-preto)	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (tamboril)	<i>Luehea candicans</i> (açoita-cavalo)	<i>Senna multijuga</i> (aleluia-amarela)
<i>Apeiba tibourbou</i> (pente-de-macaco)	<i>Eriotheca gracilipes</i> (paineira)	<i>Luehea paniculata</i> (açoita-cavalo)	<i>Simarouba amara</i> (marupá)
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> (peroba-mico)	<i>Eriotheca pubescens</i> (paineira-do-cerrado)	<i>Magnolia ovata</i> (magnólia-do-brejo)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Aspidosperma parvifolium</i> (guatambu-branco)	<i>Erythrina cristagalli</i> (suinã)	<i>Magonia pubescens</i> (tingui)	<i>Strychnos pseudoquina</i> (quina-do-cerrado)
<i>Aspidosperma polyneuron</i> (guatambu-amargoso)	<i>Erythrina falcata</i> (eritrina-crista-de-galo)	<i>Maprounea guianensis</i> (cascudinho)	<i>Styrax ferrugineus</i> (laranjinha-do-campo)
<i>Aspidosperma subincanum</i> (guatambu-vermelho)	<i>Erythrina speciosa</i> (corticeira-da-serra)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Syagrus flexuosa</i> (coquinho-babão)
<i>Aspidosperma tomentosum</i> (peroba-do-cerrado)	<i>Erythrina verna</i> (canivete)	<i>Miconia albicans</i> (pixirica)	<i>Syagrus oleracea</i> (gueroba)
<i>Astronium fraxinifolium</i> (jequirá)	<i>Eugenia dysenterica</i> (cagaíta)	<i>Mouriri pusa</i> (puçá)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Attalea phalerata</i> (babaçu)	<i>Eugenia florida</i> (guamirim)	<i>Myracrodruon urundeuva</i> (aroeira)	<i>Tabebuia aurea</i> (ipê-caraíba)
<i>Attalea speciosa</i> (babaçu)	<i>Euterpe edulis</i> (açaí-do-cerrado)	<i>Myrcia tomentosa</i> (araçazinho)	<i>Tabebuia roseoalba</i> (ipê-branco)
<i>Bowdichia virgilioides</i> (sucupira-preta)	<i>Gallesia integrifolia</i> (pau-d'alho)	<i>Myroxylon peruiferum</i> (óleo-de-bálsamo)	<i>Tachigali subvelutina</i> (carvoeiro)
<i>Brosimum gaudichaudii</i> (mama-cadela)	<i>Garcinia brasiliensis</i> (bacuri)	<i>Myrsine umbellata</i> (capororoca)	<i>Tapura amazonica</i> (manguito)
<i>Buchenavia tomentosa</i> (pau-pilão)	<i>Guapira noxia</i> (caparrosa)	<i>Ocotea spixiana</i> (canela)	<i>Tococa guianensis</i> (tococa-da-guiana)
<i>Butia leiospatha</i> (coquinho-azedo)	<i>Guarea guidonia</i> (peloteira)	<i>Ormosia arborea</i> (coronheira)	<i>Trembleya parviflora</i> (trembleia)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Guazuma ulmifolia</i> (mutamba)	<i>Ormosia fastigiata</i> (tento)	<i>Triplaris gardneriana</i> (novateiro-preto)
<i>Cabralea canjerana</i> (canjerana)	<i>Hancornia speciosa</i> (mangaba)	<i>Parkia platycephala</i> (fava-de-bolota)	<i>Vachellia farnesiana</i> (acácia)
<i>Cariniana rubra</i> (jequitibá-vermelho)	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (ipê-dourado)	<i>Peltogyne confertiflora</i> (guarubu-roxo)	<i>Virola sebifera</i> (bicuiba)
<i>Casearia rupestris</i> (guaçântuba-grande)	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (ipê-rosa)	<i>Pera glabrata</i> (tamanqueira)	<i>Vochysia elliptica</i> (pau-doce)
<i>Casearia sylvestris</i> (caferane)	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (ipê-roxo-de-bolo)	<i>Physocalymma scaberrimum</i> (cega-machado)	<i>Vochysia rufa</i> (pau-doce)
<i>Cassia ferruginea</i> (cássia)	<i>Handroanthus ochraceus</i> (ipê-do-cerrado)	<i>Platymiscium floribundum</i> (jacarandá-do-litoral)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Centrolobium tomentosum</i> (araribá)	<i>Handroanthus serratifolius</i> (ipê-amarelo)	<i>Platypodium elegans</i> (canzileiro)	<i>Xylopia emarginata</i> (pindaíba-preta)
<i>Clusia criuva</i> (gameleira)	<i>Hirtella glandulosa</i> (coco-de-bode)	<i>Protium heptaphyllum</i> (breu)	<i>Xylopia sericea</i> (pindaíba-vermelha)
<i>Copaifera langsdorffii</i> (copaíba-vermelha)	<i>Hirtella gracilipes</i> (bosta-de-cabra)	<i>Protium spruceanum</i> (almecegueira-do-brejo)	<i>Zanthoxylum riedelianum</i> (maminha-de-porca)
<i>Cordia glabrata</i> (peteribi)	<i>Hymenaea courbaril</i> (jatobá-da-mata)	<i>Pseudobombax longiflorum</i> (embiruçu-do-mato)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Achyrocline satureioides</i> (macela)	<i>Calea gardneriana</i> (margaridinha)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Paspalum reduncum</i> (capim-reduco)
<i>Anacardium humile</i> (cajuzinho-do-cerrado)	<i>Calliandra dysantha</i> (caliandra)	<i>Jacaranda caroba</i> (jacarandá)	<i>Protium ovatum</i> (almécega)
<i>Andropogon bicornis</i> (capim-rabo-de-cavalo)	<i>Davilla elliptica</i> (lixeirinha)	<i>Loudetiopsis chrysothrix</i> (capim-brinco)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)
<i>Aristida recurvata</i> (capim-recurvado)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Marcetia taxifolia</i> (marcetia)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Mirania chamissois</i> (pixirica)	<i>Syngonanthus nitens</i> (capim-dourado)
<i>Bidens gardneri</i> (picao-vermelho)	<i>Eremanthus erythropappus</i> (candeia)	<i>Paspalum convexum</i> (capim-convexo)	<i>Vellozia squamata</i> (canela-de-ema)

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em NOVEMBRO

Arbóreas

<i>Acrocomia aculeata</i> (macaúba)	<i>Dilodendron bipinnatum</i> (maria-pobre)	<i>Jacaranda cuspidifolia</i> (jacarandá)	<i>Pseudobombax tomentosum</i> (embiruçu-peludo)
<i>Agonandra brasiliensis</i> (cerveja-de-pobre)	<i>Dipteryx alata</i> (baru)	<i>Kielmeyera coriacea</i> (pau-santo)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)
<i>Alchornea glandulosa</i> (tapiá)	<i>Emmotum nitens</i> (pau-sobre)	<i>Lamanonia brasiliensis</i> (cangalheiro)	<i>Qualea parviflora</i> (pau-terrinha)
<i>Alchornea triplinervia</i> (tanheiro)	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (tamboril)	<i>Mabea fistulifera</i> (canudeiro)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)
<i>Anacardium occidentale</i> (cajueiro)	<i>Eriotheca pubescens</i> (paineira-do-cerrado)	<i>Maclura tinctoria</i> (amoreira)	<i>Rourea induta</i> (botica-inteira)
<i>Anadenanthera colubrina</i> (angico-branco)	<i>Erythrina cristagalli</i> (suinã)	<i>Magonia pubescens</i> (tingui)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)
<i>Anadenanthera peregrina</i> (angico-preto)	<i>Erythrina falcata</i> (eritrina-crista-de-galo)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Salacia elliptica</i> (bacuri-da-mata)
<i>Apeiba tibourbou</i> (penete-de-macaco)	<i>Erythrina speciosa</i> (corticeira-da-serra)	<i>Miconia albicans</i> (pixirica)	<i>Schinopsis brasiliensis</i> (quebracho-colorado)
<i>Aspidosperma parvifolium</i> (guatambu-branco)	<i>Erythrina verna</i> (canivete)	<i>Miconia ferruginata</i> (pixirica)	<i>Simarouba amara</i> (marupá)
<i>Aspidosperma subincanum</i> (guatambu-vermelho)	<i>Erythroxylum daphnites</i> (muxiba)	<i>Mouriri pusa</i> (puçá)	<i>Simarouba versicolor</i> (perdiz)
<i>Attalea phalerata</i> (babaçu)	<i>Eugenia dysenterica</i> (cagaíta)	<i>Myrcia tomentosa</i> (araçazinho)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Attalea speciosa</i> (babaçu)	<i>Eugenia florida</i> (guamirim)	<i>Myroxylon peruiferum</i> (óleo-de-bálsamo)	<i>Spondias tuberosa</i> (umbú)
<i>Bauhinia rufa</i> (pata-de-vaca)	<i>Eugenia pyriformis</i> (uvaia)	<i>Myrsine guianensis</i> (capororoca)	<i>Styrax ferrugineus</i> (laranjinha-do-campo)
<i>Bowdichia virgilioides</i> (sucupira-preta)	<i>Euterpe edulis</i> (açaí-do-cerrado)	<i>Ocotea spixiana</i> (canela)	<i>Syagrus flexuosa</i> (coquinho-babão)
<i>Brosimum gaudichaudii</i> (mama-cadela)	<i>Garcinia brasiliensis</i> (bacuri)	<i>Ormosia arborea</i> (coronheira)	<i>Syagrus oleracea</i> (gueroba)
<i>Butia leiospatha</i> (coquinho-azedo)	<i>Guapira noxia</i> (caparrosa)	<i>Ormosia fastigiata</i> (tento)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Guarea guidonia</i> (peloteira)	<i>Ouatea castaneifolia</i> (farinha-seca)	<i>Tabebuia roseoalba</i> (ipê-branco)
<i>Cabralea canjerana</i> (canjerana)	<i>Guazuma ulmifolia</i> (mutamba)	<i>Parkia platycephala</i> (fava-de-bolota)	<i>Tapura amazonica</i> (manguito)
<i>Campomanesia velutina</i> (gabirola)	<i>Hancornia speciosa</i> (mangaba)	<i>Peltogyne confertiflora</i> (guarubu-roxo)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (gabirola)	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (ipê-dourado)	<i>Pera glabrata</i> (tamanqueira)	<i>Tococa guianensis</i> (tococa-da-guiana)
<i>Caryocar coriaceum</i> (pequi-branco)	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (ipê-rosa)	<i>Physocalymma scaberrimum</i> (cega-machado)	<i>Triplaris americana</i> (pau-formiga)
<i>Casearia sylvestris</i> (caferane)	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (ipê-roxo-de-bolo)	<i>Plathymenia reticulata</i> (vinhático-do-cerrado)	<i>Vachellia farnesiana</i> (acácia)
<i>Cassia ferruginea</i> (cássia)	<i>Handroanthus ochraceus</i> (ipê-do-cerrado)	<i>Platymiscium floribundum</i> (jacarandá-do-litoral)	<i>Vatairea macrocarpa</i> (amargosa)
<i>Cecropia glaziovii</i> (imbaúba-vermelha)	<i>Handroanthus serratifolius</i> (ipê-amarelo)	<i>Platypodium elegans</i> (canzeiro)	<i>Vitex polygama</i> (tarumã-do-cerrado)
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (bacupari-da-mata)	<i>Inga cylindrica</i> (ingá-feijão)	<i>Protium heptaphyllum</i> (breu)	<i>Vochysia elliptica</i> (pau-doce)
<i>Cordia trichotoma</i> (freijó)	<i>Inga sessilis</i> (ingá-macaco)	<i>Protium spruceanum</i> (almecegueira-do-brejo)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Curatella americana</i> (lixeira)	<i>Jacaranda brasiliiana</i> (jacarandá)	<i>Pseudobombax longiflorum</i> (embiruçu-do-mato)	<i>Xylopia emarginata</i> (pindaíba-preta)

Arbustivas e Herbáceas

<i>Anacardium humile</i> (cajuzinho-do-cerrado)	<i>Cordia sessilis</i> (marmelada-de-cachorro)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Paspalum reduncum</i> (capim-reduco)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Davilla elliptica</i> (lixeirinha)	<i>Loudetiopsis chrysothrix</i> (capim-brinco)	<i>Protium ovatum</i> (almécega)
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Duguetia furfuracea</i> (araticum-do-campo)	<i>Marcetia taxifolia</i> (marcetia)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)
<i>Bidens gardneri</i> (picao-vermelho)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Mesosetum loliiforme</i> (capim-canivete)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)
<i>Calea gardneriana</i> (margaridinha)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Miconia chamissois</i> (pixirica)	<i>Stylosanthes capitata</i> (estilosantes)
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Eremanthus erythropappus</i> (candeia)	<i>Paspalum convexum</i> (capim-convexo)	<i>Syngonanthus nitens</i> (capim-dourado)

Lista de espécies para recomposição ambiental no bioma Cerrado com frutos e sementes maduros em DEZEMBRO

Arbóreas

<i>Acrocomia aculeata</i> (macaúba)	<i>Cordia trichotoma</i> (freijó)	<i>Miconia burchellii</i> (pixirica)	<i>Roupala montana</i> (carne-de-vaca)
<i>Agonandra brasiliensis</i> (cerveja-de-pobre)	<i>Curatella americana</i> (lixeira)	<i>Miconia ferruginata</i> (pixirica)	<i>Rourea induta</i> (botica-inteira)
<i>Alchornea glandulosa</i> (tapiá)	<i>Diospyros hispida</i> (caquizeiro-do-cerrado)	<i>Mouriri pusa</i> (puçá)	<i>Salacia crassifolia</i> (bacupari-do-cerrado)
<i>Alchornea triplinervia</i> (tanheiro)	<i>Diospyros sericea</i> (caqui-da-mata)	<i>Myrcia splendens</i> (araçazinho)	<i>Salacia elliptica</i> (bacuri-da-mata)
<i>Alibertia edulis</i> (marmelada-de-cavalo)	<i>Emmotum nitens</i> (pau-sobre)	<i>Myrcia tomentosa</i> (araçazinho)	<i>Simarouba amara</i> (marupá)
<i>Anacardium occidentale</i> (cajueiro)	<i>Erythrina cristagalli</i> (suinã)	<i>Myroxylon peruiferum</i> (óleo-de-bálsamo)	<i>Simarouba versicolor</i> (perdiz)
<i>Aspidosperma subincanum</i> (guatambu-vermelho)	<i>Erythrina verna</i> (canivete)	<i>Myrsine guianensis</i> (capororoca)	<i>Solanum lycocarpum</i> (lobeira)
<i>Attalea phalerata</i> (babaçu)	<i>Erythroxylum daphnites</i> (muxiba)	<i>Ocotea odorifera</i> (canela-sassafrás)	<i>Spondias tuberosa</i> (umbú)
<i>Attalea speciosa</i> (babaçu)	<i>Eugenia klotzschiana</i> (pera-do-cerrado)	<i>Ocotea spixiana</i> (canela)	<i>Styrax ferrugineus</i> (laranjinha-do-campo)
<i>Bauhinia rufa</i> (pata-de-vaca)	<i>Eugenia pyriformis</i> (uvaia)	<i>Ormosia arborea</i> (coronheira)	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (jerivá)
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (maria-preta)	<i>Euterpe edulis</i> (açaí-do-cerrado)	<i>Ouratea castaneifolia</i> (farinha-seca)	<i>Tapirira guianensis</i> (fruta-de-pombo)
<i>Brosimum gaudichaudii</i> (mama-cadela)	<i>Guarea guidonia</i> (peloteira)	<i>Ouratea spectabilis</i> (folha-de-serra)	<i>Tapirira obtusa</i> (fruta-de-pombo)
<i>Butia leiospatha</i> (coquinho-azedo)	<i>Handroanthus serratifolius</i> (ipê-amarelo)	<i>Pera glabrata</i> (tamanqueira)	<i>Terminalia fagifolia</i> (mussambé)
<i>Byrsonima intermedia</i> (murici-pequeno)	<i>Inga laurina</i> (ingá-de-quatro-folhas)	<i>Plathymenia reticulata</i> (vinhático-do-cerrado)	<i>Triplaris americana</i> (pau-formiga)
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (murici-de-tabuleiro)	<i>Inga sessilis</i> (ingá-macaco)	<i>Platymiscium floribundum</i> (jacarandá-do-litoral)	<i>Vachellia farnesiana</i> (acácia)
<i>Campomanesia velutina</i> (gabirolba)	<i>Inga vera</i> (ingá)	<i>Pleroma candolleana</i> (quaresmeira-da-serra)	<i>Vatairea macrocarpa</i> (amargosa)
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (gabirolba)	<i>Lithraea molleoides</i> (aroeira-branca)	<i>Pouteria ramiflora</i> (currióla)	<i>Vitex polygama</i> (tarumã-do-cerrado)
<i>Caryocar brasiliense</i> (pequizeiro)	<i>Mabea fistulifera</i> (canudeiro)	<i>Pouteria torta</i> (currióla)	<i>Vochysia elliptica</i> (pau-doce)
<i>Caryocar coriaceum</i> (pequi-branco)	<i>Maclura tinctoria</i> (amoreira)	<i>Protium heptaphyllum</i> (breu)	<i>Vochysia tucanorum</i> (gomeira)
<i>Cecropia glaziovii</i> (imbaúba-vermelha)	<i>Mauritia flexuosa</i> (buriti)	<i>Protium spruceanum</i> (almecegueira-do-brejo)	
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (bacupari-da-mata)	<i>Miconia albicans</i> (pixirica)	<i>Qualea dichotoma</i> (pau-terra-da-mata)	

Arbustivas e Herbáceas

<i>Axonopus capillaris</i> (grama-capilosa)	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (chama-cristo)	<i>Mesosetum loliiforme</i> (capim-canivete)	<i>Riencourtia oblongifolia</i> (margaridinha-branca)
<i>Axonopus siccus</i> (grama-sicosa)	<i>Cordia sessilis</i> (marmelada-de-cachorro)	<i>Paspalum convexum</i> (capim-convexo)	<i>Schizachyrium microstachyum</i> (capim-marrom)
<i>Baccharis humilis</i> (alecrim-do-campo)	<i>Duguetia furfuracea</i> (araticum-do-campo)	<i>Paspalum gardnerianum</i> (capim-gardineiro)	<i>Tristachya leiostachya</i> (aveia-do-cerrado)
<i>Bidens gardneri</i> (picao-vermelho)	<i>Echinolaena inflexa</i> (capim-flexinha)	<i>Paspalum reduncum</i> (capim-reduco)	<i>Xyris longiscapa</i> (sempre-viva)
<i>Calea gardneriana</i> (margaridinha)	<i>Eragrostis rufescens</i> (capim-orvalho)	<i>Piper arboreum</i> (pimenta-de-macaco)	
<i>Campomanesia adamantium</i> (gabirolba)	<i>Hypogynium virgatum</i> (capim-virgato)	<i>Protium ovatum</i> (almécega)	



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

GOVERNO
FEDERAL